

## Vårnyheter i urval

### Nya behandlingsrekommendationer:

**Osteoporos:** Vårdprogrammet för Kalmar län har uppdaterats. Den nya versionen finns på Läkemedelskommitténs hemsida på [www.ltkalmar.se](http://www.ltkalmar.se).

**Urinträngningar och trängningsinkontinens – överaktiv blåsa:** Ny behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket, finns på [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

### Nytt avtal med industrin

Den nya överenskommelsen om samarbetsformer mellan Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och sjukvården finns nu på Läkemedelskommitténs hemsida på [www.ltkalmar.se](http://www.ltkalmar.se)

### Nya läkemedel

**Onbrez** (indakaterol): betareceptoragonist med lång duration, för behandling av KOL. Närmaste konkurrent är Oxis (formoterol).

**Zostavax** (vaccin mot herpes zoster). Ingår i högkostnadsskyddet.

**Qutenza:** capsaicinplåster för behandling av perifer neuropatisk smärta hos vuxna icke-diabetiker. Appliceras i 30-60 minuter en gång var 3:e månad. Ska ges av läkare eller av vårdpersonal under överinseende av läkare. Kräver förbehandling med lokalanestetika!

**Brilique** (ticagrelor): trombocythämmande medel som är en konkurrent till klopidogrel och prasugrel (Efient), men också dyrare. Reversibel effekt. Specialistpreparat för kardiologer.

**Eliquis** (apixaban): ytterligare ett peroralt medel för trombosprofilax efter protesoperation i höft eller knä. Beslut om pris och subvention kommer senare.

### Nytt sänkt pris:

Priset för **Cervarix** (vaccin mot HPV) har sänkts till 582:50 kr per spruta. Priset för Gardasil är 1118 kr per spruta.

### Nya rön om biverkningar:

**Atypiska femurskaftfrakturer som biverkan av bisfosfonater** (se [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se), 2011-04-15). Dessa frakturer ofta är bilaterala. En del patienter känner smärtor eller obehag i lår, höft eller lumske några veckor innan frakturen upptäcks. Vid atypisk fraktur på ena sidan bör man aktivt fråga om symtom från den andra sidan. Vid minsta misstanke om fraktur röntgas benet.

I en kanadensisk populationsbaserad fall-kontroll-studie sågs nära tredubblad risk (RR 2,74) för subtrochantära eller femurskaftfrakturer efter 5 års behandling med bisfosfonater, jämfört med upp till 100 dagars behandling. Efter samma tid var risken för typiska osteoporosrelaterade femurfrakturer reducerad med 24% (Park-Wyllie et al., JAMA 2011).

I en svensk registerbaserad kohortstudie beräknades den relativa risken för atypisk femurfraktur efter behandling med bisfosfonater i minst 2 år till 47, relaterat till ingen behandling alls. Ökningen i absolut risk beräknades till 5 extra fall per 10 000 patientår (Schilcher et al. NEJM 2011).

Fortsätt att rapportera atypiska frakturer som misstänkt biverkning till Läkemedelsverket!

**Ökad risk för hjärtinfarkt även vid korttidsbehandling med diklofenak.** En ny dansk registerstudie visade att patienter med tidigare hjärtinfarkt hade drygt 3 gånger förhöjd risk att få en andra infarkt, eller avlida, under den första behandlingsveckan med diklofenak! För naproxen sågs ingen signifikant riskökning (Olsen et al. Circulation 2011).

**Psykiatriska och beteenderelaterade biverkningar av montelukast (Singulair).** I vissa länder har man sett en högre frekvens än förväntat av psykiatriska biverkningar hos barn. EUs läkemedelsmyndighet (EMA) vill därför att företaget redovisar hur man tänker följa upp användningen av montelukast just hos barn.

Läkemedelskommittén, genom

Ellen Vinge, ordförande

Referenser finns på sid 2

REFERENSER:

Park-Wyllie LY, Mamdani MM, Juurlink DN, Hawker GA, Gunraj N, Austin PC, Whelan DB, Weiler PJ, Laupacis A. Bisphosphonate use and the risk of subtrochanteric or femoral shaft fractures in older women. JAMA. 2011 Feb 23;305(8):783-9. PMID: 21343577.

Schilcher J, Michaëlsson K, Aspenberg P. Bisphosphonate use and atypical fractures of the femoral shaft. N Engl J Med. 2011 May 5;364(18):1728-37. PMID: 21542743.

Olsen AMS, Fosbøl EL, Lindhardsen J et al. Duration of treatment with nonsteroidal anti-inflammatory drugs and impact on risk of death and recurrent myocardial infarction in patients with prior myocardial infarction: A nationwide cohort study. Circulation online pub 9. maj 2011 <http://circ.ahajournals.org/cgi/content/abstract/CIRCULATIONAHA.110.004671v1>

Läs mer om nyheter från European Medicines Agency (EMA) och Läkemedelsverket:

Montelukast – rapporter om psykiatriska och beteenderelaterade biverkningar. Månadsrapport från CHMP och PhVWP (februari 2011), [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se) (publicerat den 2 mars 2011)

Bisfosfonater och atypiska frakturer. Nyheter. [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se) (publicerat den 15 april 2011).