

## Skott(års)pengar för "olämpliga läkemedel" till äldre

Staten och SKL har kommit överens om ekonomiska incitament för att förbättra samverkan mellan kommuner och landsting i vården av de mest sjuka äldre. Ett mål är minskad förskrivning av "Olämpliga läkemedel". Med detta avses läkemedel som bör undvikas till äldre, såvida inte särskilda skäl föreligger, enligt Socialstyrelsens "Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre" från 2010. Vid en mätning i september 2011 hade 10,5% av alla länsinvånare över 65 år något "olämpligt läkemedel".

### Långverkande bensodiazepiner

Förskrivningen av nitrazepam och flunitrazepam är högst till de allra äldsta, medan diazepam används mest i medelåldern. I Kalmar län är förskrivningen av diazepam och nitrazepam nära genomsnittet för Riket. Flunitrazepam skrivs ut i något mindre grad än i Riket


### Läkemedel med betydande antikolinerga effekter

I denna grupp ingår "urologiska spasmolytika" som ges vid "överaktiv blåsa" hos män och kvinnor. Prevalensen ökar med åldern (se Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer från 2011). I Kalmar län är förskrivningen av sådana medel lägre än för genomsnittet i Riket.

### Tramadol

Förskrivningen av tramadol i Kalmar län är betydligt högre än för genomsnittet i riket.

Tramadol - förskrivning 2011-Q4



Alla grafer gäller fjärde kvartalet 2011:

Blå stapel = Riket

Lila stapel = Kalmar län


DDD = Definierade DygnsDoser (enl WHO)

TIN = 1000 invånare

### Propiomazin (Propavan)

Förskrivningen av propiomazin till äldre är lägre i Kalmar län än i övriga riket.


Propiomazin - förskrivning 2011-Q4



### Läkemedel mot psykos i särskilda boenden

Eftersom detta är svårt att mäta används surrogatvariabeln läkemedel mot psykos som förskrivs via Dos-recept. Antalet utlösta Dos-recept för neuroleptika ökar kraftigt med åldern, men per 1000 invånare över 65 år är de något färre i vårt län än i riket. Genomsnittligt antal DDD per Dos-recept var 9,7 för gruppen 65-74 år, och 2,4 för de allra äldsta.

Antipsykotiska läkemedel - Dos-recept 2011-Q4



### "Olämpliga läkemedelskombinationer"

(= D-interaktioner enligt den svenska klassifikationen för interaktioner). Detta är kombinationer som ökar risken för allvarliga biverkningar. Mäts som samtidig användning av de interagerande läkemedlen vid ett visst datum, baserat på individrelaterade data över utlösta recept. Vid mättilfället i september 2011 hade 2,5% av alla länets medicinerande invånare över 65 år minst en olämplig läkemedelskombination. Vanliga kombinationer är Waran plus NSAID, Waran plus Trombyl, och kalium plus kaliumsparande medel.

Läkemedelskommittén genom  
Ellen Vinge